

بیماران خیریه حضرت صدیقه زهرا (س)



حساسیت

آنافیلاکسی

در بعضی افراد آلرژی غذایی ممکن است واکنش حساسیتی شدیدی به نام آنافیلاکسی ایجاد کند. این بیماری ممکن است موجب نشانه‌های تهدیدکننده زندگی شود که شامل موارد زیر هستند:

- گرفتگی یا تنگ شدن مسیر هوایی؛
- تورم گلو یا احساس وجود توده در گلو که تنفس را سخت می‌کند؛
- شوک با افت شدید فشار خون؛
- نبض تند؛
- سرگیجه، ضعف یا کاهش هوشیاری.

شناسایی بیمار مبتلا به حساسیت

سیستم رنگ "قرمز" دستبند شناسایی برای شناسایی بیماران مبتلا به آلرژی دارویی و غذایی شناخته شده و استفاده می‌شود.



۵

علائم حساسیت غذایی

علائم حساسیت غذایی معمولاً چند دقیقه تا دو ساعت بعد از مصرف غذای مشکل‌ساز بروز می‌کند.

شایع‌ترین علائم حساسیت غذایی شامل موارد زیر است:


- گزگز و خارش دهان؛
- کهیر، خارش یا اگزما؛
- تورم لب‌ها، صورت، زبان و گلو یا بخش‌های دیگر بدن؛
- خس خس سینه، گرفتگی بینی یا مشکل تنفس؛
- دل درد، اسهال، حالت تهوع یا استفراغ

سرگیجه، ضعف یا غش.

۴

حساسیت غذایی

حساسیت غذایی نوعی واکنش سیستم ایمنی بدن است که بلافاصله بعد از خوردن غذاهای خاص اتفاق می‌افتد. حتی مقدار کمی از غذاهای حساسیت‌زا ممکن است نشانه‌هایی مانند مشکلات و بیماری‌های گوارشی، کهیر یا تورم راه هوایی را همراه داشته باشد. حساسیت غذایی در بعضی افراد، علائم شدید یا حتی نوعی واکنش تهدیدکننده زندگی به نام آنافیلاکسی ایجاد می‌کند.



۳

علائم حساسیت دارویی

اولین باری که یک دارو خاص را مصرف می‌کنید، ممکن است علائم حساسیت دارویی را احساس نکنید. چرا که بدن اقدام به تولید آنتی‌بادی کرده است. در نتیجه بار دومی که دارو را مصرف می‌کنید، سیستم ایمنی بدن آن را به عنوان عامل مهاجم شناسایی کرده و در نتیجه برای دفاع در برابر آن مواد شیمیایی خاصی را تولید می‌کند.

این علائم شامل:

- دانه‌ها یا جوش‌های پوستی و کهیر خارش
- خس خس سینه و سایر مشکلات تنفسی

ورم

تهوع

احساس گیجی و سرگیجه

۲

حساسیت دارویی

افرادی که به حساسیت دارویی (Drug Allergy) مبتلا هستند، در صورت مصرف قرص، شربت و یا تزریق دارو علائم آن را تجربه خواهند کرد. اگر در مورد علت بروز علائم خود احساس سردرگمی می‌کنید و نمی‌دانید که مصرف کدام دارو برای شما مشکلی ایجاد نمی‌کند، حتماً با پزشک متخصص آلرژی تماس بگیرید.



کهیر

۱