




آمادگی قبل از آندوسکوپی:

- ۱- لطفاً ۶ ساعت قبل از انجام آندوسکوپی ناشتا باشید؛ وعده شام تنها سوپ میل شود.
- ۲- از مصرف لبنیات ۲۴ ساعت قبل از آندوسکوپی خودداری شود.
- ۳- در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد مانند آسپرین و وارفارین ۴۸ ساعت قبل، دارو قطع شود.
- ۴- مصرف داروهای گوارشی مانند پنتوپرازول، امپرازول از یک هفته قبل قطع شود.
- ۵- در صورت ابتلا به بیماری دیابت، هیپاتیت، ایدز و بیماری قلبی به پزشک مربوطه اطلاع دهید.
- ۶- نوبت شما با نظر پزشک تعیین می شود، لطفاً در این خصوص صبر و حوصله داشته باشید.

مراقبت های بعد از آندوسکوپی:

- ۱- تا ۲۰ دقیقه بعد از آندوسکوپی چیزی میل نکنید.
- ۲- از سرم شستشو با آب ولرم و نمک جهت غرغره دهانی استفاده کنید.
- ۳- در صورت مشاهده علائم زیر به بیمارستان مراجعه نمایید: درد شکم، تغییر رنگ مدفوع، استفراغ خونی، تب، عرق سرد، ضعف و بیحالی، تپش قلب، پایین آمدن سطح هوشیاری، تنگی نفس

آندوسکوپی



کولونسکوپی

نکاتی بعد از کولونسکوپی

- ۱- برای اینکه شما در شرایط آرام تری قرار بگیرید پزشک معالج از داروهای آرام بخش استفاده می کند. پس باید ۱-۲ ساعت بعد از کولونسکوپی استراحت کرد تا هوشیاری کامل بازگردد.
- ۲- همراه داشتن کارت ملی و یک نفر همراه ضروری می باشد
- ۳- اجتناب از رانندگی
- ۴- در صورتیکه احساس نفخ/ دفع گاز/ اجابت مزاج داشته باشید این امر طبیعی می باشد
- ۵- اگر درد شدید شکم/ تب/ وجود خون در دفعات بعدی مدفوع داشته باشید حتماً با پزشک معالج مشورت فرمایید.

علل انجام کولونسکوپی

- ۱- بررسی علل اسهال مزمن و یبوست مکرر
- ۲- بررسی علل ایجاد پولیپ
- ۳- بررسی علل کاهش وزن ناگهانی
- ۴- بررسی علل خونریزی راست روده یا وجود خون در مدفوع
- ۵- بررسی علل کمبود آهن و کم خونی
- ۶- بررسی علل درد طولانی مدت بدون دلیل در ناحیه شکم
- ۷- بررسی سرطان روده بزرگ و راست روده



آدرس: تهران، دولت آباد، بلوار قدس
تلفن: ۳۳۳۷۰۰۸-۹

کولونسکوپی

تعریف کولونسکوپی

روشی برای بررسی و معاینه دقیق دیواره ی روده هاست که اگر مشکلاتی از قبیل پولیت روده/ وجود خون در مدفوع/ سرطان روده/ انواع تغییرات اجابت مزاج وجود دارد، با این روش (تشخیص و درمان) سریع آن را آغاز نمود.

آمادگی برای انجام کولونسکوپی

برای انجام کولونسکوپی قبل از هر چیزی باید روده های شما به طور کامل خالی و تمیز باشد تا بتوان تصاویر مورد نیاز را به طور دقیق تهیه کرد. به همین منظور باید ۲۴ ساعت قبل از انجام کولونسکوپی به نکات ذیل توجه فرمایید.

- ۱- اجتناب از غذا خوردن
- ۲- افزایش مصرف مایعات شفاف مثل آب/چای/ آب میوه سیب صاف شده
- ۳- جهت تخلیه کامل روده ها از داروهای ملین که برحسب تجویز پزشک معالج استفاده شود
- ۴- اگر از داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین/ مکمل های غذایی حاوی آهن/ داروهای دیابت استفاده می کنید، حتماً قبل از انجام کولونسکوپی به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
- ۵- اجتناب از مصرف لبنیات/ شیر

کولونسکوپی چگونه انجام می شود

دستگاه کولونسکوپ از یک لوله ی بسیار باریک و فوق العاده انعطاف پذیر ساخته شده است که در قسمت سر آن دوربینی بسیار کوچک قرار گرفته است که می تواند تصاویری بسیار دقیق و واضح به ما ارائه دهد.



آدرس: تهران، دولت آباد، بلوار قدس
تلفن: ۳۳۳۷۰۰۸-۹