



بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س)

(هایپرتانسیون) بالا فشار خون



روابط عمومی / واحد آموزش بیمار و ارتقاء سلامت - آذر ۹۹

آدرس: تهران، دولت آباد، بلوار قدس

تلفن: ۰۲۱-۳۳۳۷۰۰۸۹ فکس: ۳۳۷۴۷۲۸۲

WWW.ZAHRA-HOSPITAL.COM

- * اهداف درمان با توجه به ویژگی های هر فرد تعیین خواهند شد و ممکن است شامل کم کردن وزن، ترک دخانیات، کنترل استرس، برنامه ورزش مناسب و اصلاح شیوه زندگی باشند.
- * گرفتن فشار خون خودتان را فرابگیرید و روزانه فشار خون را اندازه گیری کنید.
- * تحت نظر یک پزشک باشید و مرتباً مراجعه کنید.

داروها

- * در صورت عدم کنترل بیماری، با رعایت موارد فوق ممکن است نیاز به درمان دارویی باشد.
- * با استفاده از داروهای ضد فشار خون می توان فشار خون را پایین آورد.

فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

لازم است افرادی که مبتلا به فشارخون هستند محدوده فعالیت خود را به صورت زیر تنظیم کنند: فعالیت همراه با برنامه ورزشی حداقل ۳ بار در هفته. ورزش باعث کم شدن استرس و حفظ وزن بدن در حد ایده آل می شود. پیاده روی و ورزش حتی ممکن است به کنترل فشار خون کمک کند.

رژیم غذایی

افرادی مبتلا به فشار خون بالا، رژیم غذایی آنها به این صورت است: رژیم غذایی کم نمک - در صورت اضافه وزن، رژیم مناسب کاهش وزن - با پزشک یا کارشناس تغذیه مشورت کنید.

شرایط مراجعه به پزشک

درد قفسه سینه - علی رغم درمان، علایم فشار خون بالا ادامه داشته باشد - اگر علایم جدید و غیر قابل توجهی ظاهر شوند.


شرح بیماری

فشار خون بالا عبارت است از افزایش فشار وارده از جریان خون به دیواره رگ های خونی، این بیماری تا مراحل انتهایی اکثراً هیچ علامتی ندارد. فشار خون در افراد طبیعی در اثر استرس (فشار روحی) و فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بالا می رود، فردی که دچار بیماری فشار خون بالاست، به هنگام استراحت نیز فشار خونس بالاتر از حد طبیعی قرار دارد.

پ

علائم بیماری

فردی که بیماری فشار خون دارد علائم زیر بسته به شدت بیماری در فرد بروز می نماید. پ



- * سر درد
- * خواب آلودگی
- * گیجی و منگی سر
- * کرختی و مور مور شدن در دست ها و پاها
- * خونریزی از بینی
- * تنگی نفس شدید

علل شایع بیماری

معمولاً ناشناخته است ولی بعضی از بیماری ها می توانند باعث فشار خون بالا شوند. پ
مانند: تنگ شدن عروق (تصلب شرایین) _ بیماری مزمن کلیه _ تنگ شدن شریک سرخرگ آئورت _ اختلال در بعضی از غدد درون ریز. پ

عوامل شایع تشدید کننده بیماری

سن بالای ۶۰ سال - چاقی - سیگار کشیدن - استرس - وابستگی به الکل - رژیم غذایی حاوی نمک یا چربی اشباع شده - کم تحرکی - سابقه خانوادگی فشار خون بالا - سکته مغزی - حمله قلبی یا نارسایی کلیه - سایر موارد. پ

عواقب مورد انتظار

این بیماری بسته به شدت آن می تواند عوارض خوش خیم و بدخیمی را در بر داشته باشد. پ
* با درمان می توان از عوارض پیشگیری نمود. پ
* بدون درمان احتمال حمله قلبی یا مغزی زیاد می شود. پ

عوارض احتمالی

در صورت عدم کنترل فشار خون و یا عدم درمان به موقع ممکن است این عوارض در شما بروز نماید: سکته قلبی - سکته مغزی - نارسایی احتقانی قلب و ورم ریه - نارسایی کلیه - اختلالات بینایی.

تشخیص و درمان

جهت تشخیص و درمان بیماری فشار خون اقدامات زیر انجام می شود:
* بررسی های تشخیصی ممکن است شامل اندازه گیری فشار خون، آزمایش خون و نوار قلب باشد.

